

資料 1. 3. 3 PEG地域連携パス (医療者用)

治療目標		連携病院			施設病院					在宅		転院			
		施設準備フェーズ(～施設前)	手術前	術後	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	在宅準備フェーズ	在宅フェーズ	転院準備フェーズ	転院フェーズ		
患者状態	バイタルサイン	熱	38.0℃以下	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	臓器別の症状状態	口腔・咽頭	口腔内が保清潔されている	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	外傷・術部の状態	術創部	腹部の清潔が保たれている	⇒	PEG挿入部から出血がない	⇒	発赤・腫脹・浸出がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	痛み・不快感	痛み(体表面)		⇒	Pスケール2以下	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	食事	摂取状況		⇒	胃の安静が保たれている	⇒	経腸栄養が開始できる	⇒	経腸栄養が実施できる	⇒	⇒	⇒	⇒		
栄養指標												栄養指標の悪化なし (Alb3.0以上 体重減少率5%以下・%TSF 以上)	栄養指標の悪化なし (Alb3.0以上 体重減少率5%以下・%TSF 以上)		
生活動作	ADL	ADL安静	フリー	⇒	安静が保てる	⇒	フリー	⇒	逆流・誤嚥がない	⇒	⇒	⇒	⇒		
合併症	機能的			⇒	・創部の安静が保たれている ・ストッパーによる皮膚障害がない ・出血なし ・出血なし	⇒	・バンパー埋没なし ・ストッパーによる皮膚障害がない ・出血なし ・発赤、腫脹なし ・瘻孔からの漏れなし	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	消化器			⇒		⇒	・嘔吐なし ・水様性下痢なし ・腹部膨満なし	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	代謝性		血清電解質の異常なし 高血糖、脱水なし	⇒		⇒	・血清電解質の異常なし ・高血糖、脱水なし	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
患者・家族の理解	治療上の知識・技術	その他	・PEGの必要性を本人または家族が理解でき同意する ・禁止薬剤を理解している ・胃瘻手帳の必要性を理解し使用できる	⇒	・原疾患の悪化がない ・本人、家族が胃瘻手帳の記載方法を理解できる	⇒	・原疾患の悪化がない ・胃瘻の管理方法がわかる ・本人、家族が胃瘻手帳の記載方法を理解できる	⇒	⇒	⇒	⇒	・胃瘻手帳の記載ができ、合併症予防の観察やチューブケアができる ・スキネクアの使用方法がわかる	・胃瘻手帳の記載ができ、常時携帯ができる	・胃瘻手帳の使用方法を理解できる ・合併症予防の観察やチューブケアができる	・胃瘻手帳の記載ができ、常時携帯ができる
	その他		退院後の方針を確認できる	⇒		⇒		⇒	退院後の方針を決定できる	⇒	⇒	退院に向けた準備ができる	在宅に向けた準備ができる	胃瘻の管理ができる	転院に向けた準備ができる
その他	NST		栄養評価を受けられる	⇒	・適切な栄養療法が受けられる ・NSTの指導に従った栄養剤の投与が守られている	⇒	⇒	⇒	(NSTにより)栄養アセスメントが行われ、ケアプランに沿った栄養療法が行われている	⇒	⇒	(NSTにより)栄養アセスメントが行われ、ケアプランに沿った栄養療法が行われている	訪問による定期的な栄養評価が行われている 在宅での不安や今後の方針を述べる事ができる	(NSTにより)栄養アセスメントが行われ、ケアプランに沿った栄養療法が行われている	⇒
波線行線															
評価	バイタルサイン チェック・観察	検温・血圧	1検	術前×1	術後×2	3検	2検	1検	1検	1検	⇒	⇒	⇒	⇒	
	検査	画像検査	腹エコー 腹部X-P 胃カメラ								胸・腹部XP	⇒	⇒	⇒	⇒
		血液検査	NST採血					NST採血			NST採血	⇒	⇒	⇒	⇒
		その他	感染症 有・無									⇒	⇒	⇒	⇒
処置	創部管理処置		朝の内服薬注入後に 経鼻的チューブ除去		・バンパーを0.5～1cm緩める ・バンパーをくるくる回す	・バンパーを1～2cm緩める ・バンパーをくるくる回す	バンパーをくるくる回す	⇒	⇒	⇒	・バンパーをくるくる回す ・腹壁固定部の抜き(POD7日目)	バンパーをくるくる回す	・バンパーをくるくる回す ・腹壁固定部の抜き(POD7日目)	バンパーをくるくる回す	
薬剤	点滴・ビタミン剤輸液		アミノ酸加総合電解質液500ml	⇒	アミノ酸加総合電解質液1000ml	⇒	アミノ酸加総合電解質液500ml	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	点滴・炎症に作用する薬		第一世代セフェム系×術直前	⇒	第一世代セフェム系×術後	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	疼痛時		鎮痛薬(筋注用注射薬)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	内服薬		5日前に抗凝固剤を中止 中止薬以外の内服薬投与	⇒	胃瘻より朝から内服開始 抗凝固剤の内服再開日を確認する	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
食事・栄養		夕食まで通常どおり経管栄養	⇒	朝から禁飲食	⇒	昼～NST指示の経腸栄養剤開始	NST指示の経腸栄養剤+食間水	⇒	⇒	⇒	⇒	(NST指示の)経腸栄養剤+食間水 訪問による栄養評価(1回/月) アセスメントシートの記載	NST指示の経腸栄養剤+食間水	(NST指示の)経腸栄養剤+食間水 (NSTによる)栄養評価(1回/月) アセスメントシートの記載	
ADL援助	安静		フリー	⇒	ベット上フリー	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	清潔		歯科衛生士による口腔ケア 入浴可	⇒	・歯科衛生士による口腔ケア ・全身清拭	⇒	⇒	⇒	⇒	シャワー・浴可	⇒	⇒	⇒	⇒	
教育・指導・情報提供	各種手続き		同意書 オリエンテーション 胃瘻手帳を購入 退院後の方針の決定 介護保険・ケアマネの確認	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	胃瘻の管理方法 栄養療法(NST)			⇒	本人家族と一緒に胃瘻手帳の チェックシートを記入する	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	